

**Ce document reprend les consignes à respecter pour préparer un
prélèvement de mycose dans de bonnes conditions.**

PRÉLÈVEMENT - Uniquement sur rendez-vous au laboratoire

AVANT le prélèvement, merci de bien lire et suivre les instructions suivantes

TRAITEMENT CONTRE LES MYCOSES ?

Prenez-vous déjà un traitement contre cette mycose ? OUI NON

**Si oui, il faut l'arrêter bien avant le jour du prélèvement, pour retrouver des
chances d'isoler le champignon responsable de votre maladie.**

Quel type de traitement ?

Crème, poudre ou sprays : **arrêt pendant 2 semaines**

Crème Onyster ou Amychor onychoset : **1 mois d'arrêt + attendre la repousse**

Vernis : **arrêt pendant 3 mois**

Comprimés : **arrêt 2 mois sauf pour le LAMISIL, FUNGSTER (terbinafine) arrêt de 3 mois**

CONDITIONS AVANT LE PRELEVEMENT

Pour éviter de fausser les résultats de vos analyses, il est impératif de :

- Ne pas couper les ongles à ras
- Ne pas faire de pédicure, ni de ponçage
- Retirer au moins 48h à l'avance le vernis cosmétique
- Faire une toilette normale le jour du prélèvement